

POSSO DONARE?

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL DONATORE IN PERIODO COVID

il donatore dovrebbe valutare il proprio stato di salute prima di prenotare una donazione e/o rispondere alla chiamata dell'Associazione e prima di recarsi nella struttura trasfusionale.

Sintomi	Periodo di sospensione proposto x la donazione
1) asintomatico - stato di benessere - criteri generali donazione rispettati - nessun contatto stretto con persone con diagnosi o sospetta diagnosi di COVID-19	- donazione possibile
2) asintomatico - contatto stretto con persone con diagnosi o sospetta diagnosi di COVID-19	- Sospensione di 14 gg (senza tampone) - sospensione 10 gg (con tampone negativo)
3) asintomatico a) rientro da paesi esteri (all. 20 tabelle D E DPCM 13 ottobre) b) rientro da Paesi (Belgio, Francia; Croazia; Olanda; Regno Unito; Irlanda Nord; Rep. Ceca; Spagna) o transito	a) sospensione di 14 gg b) sospensione di 14 gg con obbligo di tampone al rientro all'aeroporto o entro 48h dal rientro
4) sintomatico - lievi sintomi simil influenzali - associati a mal di gola, tosse secca - terapia con antiinfluenzali o antibiotici	- Sospensione 14 gg non esecuzione tampone
5) sintomatico - febbre > 37,0° C - moderati o severi sintomi simil influenzali o altri sintomi respiratori - diagnosi o sospetta diagnosi COVID-19	- Sospensione di 28 gg come criterio di autosospensione - in caso di tampone positivo, sospensione almeno 10 gg fino a esecuzione di tampone negativo eseguito almeno 3 gg dopo la scomparsa dei sintomi (10 gg di cui 3 gg senza sintomi +test)
6) asintomatici - casi positivi a lungo termine	- sospensione fino a risoluzione completa dei sintomi ed esito negativo al test molecolare su tampone.